


©Eulàlia Velasco i Batlle i Antoni Farràs i de Blas. Barcelona, 1983
 ICHN Institut Catalana d'Història Natural. Carme, 47. 08001 Barcelona



- | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|
| Vegetació aquàtica dels estanyis salabrosos, <i>Ruppia maritima</i> | Vegetació de la franja sorrenca més propera al mar, <i>Agropyrum mediterraneum</i> | Vegetació de les dunes, <i>Ammophiletum arundinaceae</i> , sovint fragmentari | Vegetació de rereduna i dels cordons litorals sorrenca elevats, <i>Cruianelletum maritima</i> , més o menys ruderalitzat | Complex de la vegetació dels sorrells (<i>Ammophilion</i>) i de la vegetació halòfila, principalment salobrar, i també jonqueres amb abundància de <i>Juncus acutus</i> | Jonquera subhalòfila amb crassifolis, <i>Schoeno-Plantaginum</i> | Complex de prats halòfils i salobrars, <i>Schoeno-Plantaginum</i> , comunitats d' <i>Agropyron acutum</i> i <i>Juncus maritimus</i> i <i>Arthrocnemum fruticosum</i> amb <i>Halimione</i> | Prats salins d'espantina, <i>Spartino-Juncetum maritimi</i> |
| Prats salins d' <i>Agropyron</i> , comunitat d' <i>Agropyron acutum</i> i <i>Juncus maritimus</i> | Prats feblement salins de les zones marjalencques més allunyades del mar, <i>Juncus-Indetum spuriæ</i> | Vegetació de crassifolis terofítics de les concavitats o depressions temporàniament inundades, <i>Salicornietum emericæ</i> | Salobrar típic, <i>Arthrocnemum fruticosum</i> , dens i ben constituït | Comunitat de salsona als sòls més enlairats i excuts en contacte amb el salobrar, <i>Agropyron-Inuletum crithmoidis</i> | Salobrar parcialment denudat, <i>Halimione portulacoides</i> , ocasionalment amb <i>Artemisia caerulescens</i> subsp. <i>gallica</i> abundant | Salobrar d' <i>Arthrocnemum glaucum</i> , sempre diàlocat i postrat, <i>Arthrocnemum glaucum</i> | Comunitats de limòniums i de donzell mari, inclou: <i>Artemisia-Limonietum virgati</i> i pradells d'annuals de rereduna |
| Poblaments purs de <i>Plantago crassifolia</i> ; a les zones més allunyades del mar es fan en antics conreus | Complex de comunitats de limòniums i donzell mari i de salobrars. Ocasionalment amb <i>Plantago crassifolia</i> abundant | Complex de prats i comunitats de limòniums i donzell mari, <i>Juncus-Indetum spuriæ</i> + <i>Limonion galloprovincialis</i> | Complex de prats i salobrars, <i>Juncus-Indetum spuriæ</i> + <i>Arthrocnemum fruticosum</i> + <i>Halimione portulacoides</i> | Poblaments de donzell mari i plantatge crassifol d'indrets molt pasturats | Omeda, <i>Hedero-Ulmetum</i> | Canyissar halòfil, <i>Scripo-Phragmitetum</i> En estat de degradació Caissar comú, <i>Typho-Schoenoplectetum glauci</i> | Jonqueres de <i>Juncus acutus</i> d'indrets molt pasturats |
| Sorrells desproveïts de vegetació | Zones aquàtiques (continentals i marines) | Conreus | Conreus abandonats | Càmping, urbanització, etc | Malmès, no identificable | Arengleraments de tamaris | Poblaments purs d' <i>Aleuropus</i> ; sovint corresponents a una fàcies de trànsit entre el <i>Salicornietum emericæ</i> i l' <i>Arthrocnemum fruticosum</i> |