

Líquens i fongs líquenícoles (espècies dubtoses) – Nèstor Lluís Hladun, Xavier Llimona, Esteve Llop i Antonio Gómez-Bolea; Universitat de Barcelona – Novembre de 2019

Espècie	Tipus de líquen			
	Macrolíquen	Macrolíquen	Fong líquenificat, o no, que viu sobre un líquen	Fong no líquenificat habitualment estudiat pels líquenòlegs
<i>Arthonia destruens</i> Rabenh.		X		
<i>Arthonia pinastri</i> Anzi		X		
<i>Arthopyrenia subvelata</i> (Nyl.) R.C. Harris		X		
<i>Aspicilia chalybaea</i> Schaer.		X		
<i>Aspicilia hispana</i> B. de Lesd.		X		
<i>Bacidia crozalsiana</i> (H.Olivier) Zahlbr.		X		
<i>Bacidina egenula</i> (Nyl.) Vezda		X		
<i>Bellemerea sanguinea</i> (Kremp.) Hafellner et Cl. Roux		X		
<i>Lemmopsis arnoldiana</i> (Hepp) Zahlbr.		X		
<i>Porpidia albocaerulescens</i> (Wulfen) Hertel et Knoph		X		
<i>Psora crenata</i> (Taylor) Reinke	X			
<i>Psoroma lagascae</i> L.		X		
<i>Ramalina sinensis</i> Jatta	X			
<i>Rhizocarpon tinei</i> (Tornab.) Runemark		X		
<i>Stigmidium maritimum</i> (B. de Lesd.)			X	
<i>Thelidium cataractarum</i> (Hepp) Lönnr.		X		
<i>Umbilicaria corsicae</i> Frey	X			
<i>Verrucaria aranensis</i> McCarthy		X		